

ANTICUERPOS ANTI-B2 GLICOPROTEÍNA 1 (ANTI-B2GP1), IgM e IgG

Actualizado en Marzo 2026 por TM Jacqueline Parada.
Revisado y Aprobado por TM César González.

Código del Examen : 1095

Nombres del Examen : Anticuerpos Anti-B2 Glicoproteína 1 (Anti-B2GP1), IgM e IgG

Laboratorios de Procesamiento	Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
	Laboratorio CMSJ Bioquímica (Autoinmunidad)	Según demanda	4 días hábiles

Preparación del Paciente ^{1,2} : No requiere preparación

Muestra Requerida : ■ Suero
Recolectar mínimo 2 mL de sangre en un tubo tapa roja (sin anticoagulante).
(Volumen mínimo de suero: 0.5 mL)

Muestra Opcional:
No Aplica.

Estabilidad de la Muestra ^{1,2,3}	Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
	Sangre Total	8 horas	Sin información	No aplica
Suero	8 horas	21 días	21 días	

Condiciones de Envío al Laboratorio : *Dentro de Santiago y en el día
Sangre Total: Ambiente SI/ Refrigerada NO/ Congelada NO
Suero: Ambiente SI/ Refrigerada SI/ Congelada SI

*Desde fuera de Santiago
Suero: Ambiente NO/ Refrigerada SI/ Congelada SI

**Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

Método Utilizado ^{1,2} : Inmunoanálisis enzimático (ELISA)

Anticuerpos IgM B2GP1	
SMU*	Interpretación
< 20	Negativo
≥ 20	Positivo

*Unidades estándar de B2GPI IgM

Anticuerpos IgG B2GP1	
SGU*	Interpretación
< 20	Negativo
≥ 20	Positivo

*Unidades estándar de B2GPI IgG

Valor Crítico : No Aplica

Parámetros de Desempeño ^{1,2}

- : Para Anticuerpos IgM B2GP1:**
Coeficiente de Variación Analítico Interensayo:
3.8% para concentraciones de 18.7 SMU
6.6% para concentraciones de 37.2 SMU
- Para Anticuerpos IgG B2GP1:**
Coeficiente de Variación Analítico Interensayo:
4.3% para concentraciones de 18.9 SGU
5.4% para concentraciones de 44.3 SGU

Información Clínica ^{1,2,3,4}

- :** Los anticuerpos anticardiolipinas son un pilar del diagnóstico del Síndrome antifosfolípido (SAF), ya que en los Criterios de Clasificación su presencia es indispensable, junto con las manifestaciones clínicas. Los anticuerpos antifosfolípidos son anticuerpos dirigidos contra proteínas que se unen a fosfolípidos con carga aniónica. Estudios han demostrado que se necesita un cofactor de suero 50kD para que los anticuerpos anticardiolipinas se enlacen con la cardiolipina recubierta en placas de plástico. Este cofactor se ha identificado como la B2-glicoproteína 1, también denominada apolipoproteína H. Esta corresponde a un polipéptido de 326 aminoácidos, sintetizado por hepatocitos, células endoteliales y células trofoblasticas. La B2GP1 se conoce como inhibidor *in vitro* del mecanismo intrínseco de la coagulación, de la agregación plaquetaria inducida por ADP, y de la actividad de la protrombinasa en presencia de plaquetas activadas, su función fisiológica sigue sin estar clara. Los anticuerpos anti B2GP1 se encuentran con mayor frecuencia en pacientes con enfermedades del tejido conectivo, especialmente en lupus eritematoso sistémico. Para el diagnóstico de SAF, se requiere la presencia de Anti- B2GP1 sobre 40 unidades en al menos dos oportunidades separadas por 12 semanas.

Referencias

- :**
1. QUANTA Lite® B2 GPI IgM ELISA. Inserto del fabricante.
 2. QUANTA Lite® B2 GPI IgG ELISA. Inserto del fabricante.
 3. Mayo Medical Laboratories. Beta-2 Glycoprotein 1 Antibodies, IgG and IgM, Serum. Mayo Clinic.
 4. Miyakis S, Lockshin MD, Atsumi T, Branch DW, Brey RL, Cervera R, et al. International consensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS). *J Thromb Haemost* 2006; 4:295-306.