CULTIVO DE *YERSINIA*

Actualizado en Enero 2020 por TM. Laura Estrella.
Revisado y Aprobado por TM. Juan Carlos Román.

Código del Examen : 807

Nombres del Examen : Cultivo *Yersinia*, búsqueda *Yersinia*.

Laboratorios de Procesamiento :

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
Laboratorio CMSJ Microbiología	Lunes a Domingo.	2 días

Preparación del Paciente : Seguir indicaciones del instructivo a paciente IP-002

Muestra Requerida[1] : ☐ Deposición:
Preescolares y lactantes: Recolectar 3 a 4 grs. de deposición fresca en medio de trasporte Cary Blair.
También puede utilizarse una tórula rectal que se introduce 3 cm rotándola.

Adultos: Se recomienda tomar 3 muestras seriadas en días sucesivos.

Estabilidad de la Muestra :

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Deposición.	24 hrs.	48 hrs	No aplica.

Condiciones de Envío al Laboratorio : *Dentro de Santiago y en el día
Deposición : Ambiente SI /Refrigerada SI/Congelada NO

*Desde fuera de santiago
Deposición : Ambiente SI/Refrigerada SI/Congelada NO

**Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

Método Utilizado[1] : Cultivo aeróbico.

Intervalos de Referencia : Negativo.

Valor Crítico : No aplica.

Parámetros de Desempeño : No aplica.

Información Clínica[1] : El cuadro de diarrea aguda se ve normalmente en niños menores de 5 años. En niños mayores y adultos es más frecuente la adenitis mesentérica y la ileítes terminal. En estos casos se sugiere tomar hemocultivo, cultivo de líquido peritoneal o ganglio mesentericos.

Referencias

1- Mins- Playfain – Roitt- Wakelin- Willians. Microbiología Médica. Nosky/Doyma libros. 1995.
2- Murray Patrick R, Manual of Clinical Microbiology, 7ª Edición. ASM press 1999.