GEN RET (EXONES 8, 10, 11, 13, 14, 15 y 16), NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE TIPO 2 (NEM 2), ESTUDIO GENÉTICO MOLECULAR POR SECUENCIACION

Actualizado en Septiembre de 2022 por Blga. Alejandra Vera
Revisado por TM Ligia Valdivia y aprobado por Dra. Marcela Lagos

- Código del Examen** : 2387
- Nombres del Examen** : Estudio Genético Molecular del gen *RET* (exones 8, 10, 11, 13, 14, 15 y 16), Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 2 (MEN 2 o NEM 2), Estudio Genético Molecular por secuenciación
- Laboratorios de Procesamiento** :
Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
Biología Molecular	Lunes a Viernes	10 días hábiles
- Preparación del Paciente** : No requiere
- Muestra Requerida** : ■ Sangre total
Recolectar un tubo tapa lila con EDTA, volumen mínimo: 2 mL de sangre
- NOTA: Se requiere envío de copia de la orden médica**
- Muestra Opcional: Consultar al laboratorio al fono 223548515*
- Estabilidad de la Muestra** ¹ :
Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Sangre Total con EDTA	3 días	1 mes	No aplica
- Condiciones de Envío al Laboratorio** : *Dentro de Santiago y en el día
Sangre Total con EDTA: Ambiente SÍ/ Refrigerada SÍ/ Congelada NO
- *Desde fuera de Santiago
Sangre Total con EDTA: Ambiente SÍ/ Refrigerada SÍ/ Congelada NO
- *Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*
- Método Utilizado** ^{2,3,4,5} : Amplificación de ADN del proto-oncogen *RET* por PCR y secuenciación bi-direccional de los exones 8, 10, 11, 13, 14, 15 y 16. Comparación de las secuencias obtenidas con la secuencia de referencia (wildtype) para la identificación de variantes patogénicas. La nomenclatura de las variantes patogénicas y/o variantes polimórficas que se encuentren en el análisis de las secuencias, se informan con la nomenclatura según las recomendaciones de HGVS y utilizando como referencia el transcrito del gen *RET*: NM_020975.6. La clasificación de las variantes respecto del subtipo de NEM, se realiza según lo reportado en bases de datos y en bibliografía.
- Intervalos de Referencia** : No aplica
- Valor Crítico** : No aplica

Parámetros de Desempeño

: La sensibilidad clínica del estudio del gen *RET* con esta metodología es de aproximadamente 95% para MEN2A, 88% para FMTC y 98% para MEN2B. La sensibilidad y especificidad analítica es mayor al 99%. Variantes que pudieran estar presentes en los exones no analizados, intrones y promotor, no son detectadas por este ensayo.

Información Clínica ^{2,3,4,5}

: La neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM2) es un desorden autosómico dominante caracterizado por la presencia de neoplasias en tejidos endocrinos. Clínicamente, existen 3 subtipos, todos caracterizados por la presencia de cáncer medular de tiroides: NEM2A, NEM2B y cáncer medular de tiroides familiar (FMTC). NEM2 es causado por mutaciones en el proto-oncogen *RET* que codifica para una tirosina-quinasa. Esta proteína se expresa en distintos tejidos y su función principal se relaciona con el crecimiento y diferenciación celular. Variantes patogénicas en este gen producen una alteración en la proliferación celular. En NEM2B aproximadamente el 50% de las variantes patogénicas son eventos de novo.

Indicaciones:

El estudio genético-molecular está indicado en todo paciente con cáncer medular de tiroides, como también en los familiares de un paciente con diagnóstico clínico o molecular de NEM2.

Interpretación de resultados:

- Si no se observan variantes patogénicas en *RET*:

Resultado: c.[=];[=]

[=]: indica que la secuencia observada es igual a la secuencia de referencia (wild type)

Conclusión: El/La paciente no presenta variantes patogénicas en el gen *RET*.

- Si se observa una variante patogénica en *RET*:

Resultado: c.[nomenclatura en c];[=]

p.[nomenclatura en p];[=]

[=]: indica que la secuencia observada es igual a la secuencia de referencia (wild type)

Conclusión: El/La paciente es heterocigoto(a) para la variante patogénica (nomenclatura en p.) en el gen *RET*.

- Si se observan 2 variantes patogénicas en *RET*:

Resultado: c.[nomenclatura en c];[nomenclatura en c]

p.[nomenclatura en p];[nomenclatura en p]

Conclusión: El paciente es homocigoto para la variante patogénica/heterocigoto compuesto para las variantes patogénicas .../... (nomenclatura en p.)

Referencias

- :
1. Richardson A, Narendran N, Guymer R, Vu H, Baird P. (2006) Blood storage at 4°C - factors involved in DNA yield and quality. *Journal of laboratory and clinical medicine* 147: 290-294.
 2. Eng C. The relationship between specific *RET* proto-oncogene mutations and disease phenotype in multiple endocrine neoplasia type 2. *JAMA*.1996; 276(19):1575-1579
 3. Kloos RT. Medullary Thyroid Cancer: management guidelines of the American

Sistema de Información de Exámenes, SINFEX

- Thyroid Association. *Thyroid*. 2009; 19(6): 565.
4. Wohllk, N. Germline mutations of the ret proto-oncogene in Chilean patients with hereditary and sporadic medullary thyroid carcinoma. *Rev Med Chile* 2001
 5. Zhou Y. RET proto-oncogen mutations are restricted to codons 634 and 918 in mainland Chinese families with MEN2A and MEN2B. *Clinical Endocrinology*. 2007; 67:570-576. Siqueira DR et al. *Endocrine-Related Cancer*. 2010; 17: 953-963