SCREENING DE ATOPIA ADULTOS (SOLO PROYECTOS)

SUSPENDIDO TEMPORALMENTE

Actualizado en Enero 2025 por TM Jacqueline Parada
Revisado y Aprobado por TM César González

Código del Examen : **2782**

Nombres del Examen : Screening de Atopia Adultos (solo proyectos)

Laboratorios de Procesamiento :

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
Laboratorio CMSJ Bioquímica (Inmunoquímica)	Según demanda	Según acuerdo de cada proyecto

Preparación del Paciente : No requiere

Muestra Requerida[1] :

■ Suero
Recolectar mínimo 2 mL de sangre en un tubo tapa roja (sin anticoagulante).

Muestra Opcional: ■ *Plasma - EDTA*

Estabilidad de la Muestra[1,2] :

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Sangre Total	8 horas	No disponible	No aplica
Suero	7 días	7 días	6 meses (descongelar solo una vez)

Condiciones de Envío al Laboratorio :

*Dentro de Santiago y en el día
Sangre Total: Ambiente SI / Refrigerada NO / Congelada NO
Suero: Ambiente SI / Refrigerada SI/ Congelada SI

*Desde fuera de Santiago
Suero: Ambiente SI / Refrigerada SI/ Congelada SI

**Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

Método Utilizado : Inmunoensayo Fluoroenzimático / Phadia 250 / Thermo Fisher Scientific

Intervalo de Referencia[1] :

Clase	Resultado (kU_A/L)	Interpretación
0	< 0.35	Negativo
1	0.35 - 0.69	Positivo Débil
2	0.7 - 3.49	Positivo Moderado
3	3.5 - 17.49	Positivo Alto
4	17.5 - 49.99	Positivo Muy Alto
5	50 - 99.99	Positivo Muy Alto
6	≥100	Positivo Muy Alto

Valor Crítico : No aplica.

Parámetros de Desempeño[1,3] : Coeficiente de Variación Analítico Intrarensayo:
Coeficiente de Variación Analítico Interensayo:
4% para concentraciones entre 0.35 – 1.5 kU_A/L
5% para concentraciones entre 1.5 – 50 kU_A/L
9% para concentraciones entre 50 - 100 kU_A/L

Límite de cuantificación:
0.1 kU_A/L

Intervalo de medición:
Hasta 100 kU_A/L

Información Clínica[3] : El Screening de Atopia Adultos es un test cualitativo y semicuantitativo para la determinación de anticuerpos IgE específicos para alérgenos inhalantes, principales responsables de síntomas comunes como rinitis, conjuntivitis, sinusitis y asma. Está indicado como ayuda en el diagnóstico clínico de trastornos alérgicos mediados por IgE.

Referencias :

1. Phadia AB. ImmunoCAP® Specific IgE. Inserto del fabricante.
2. Heil W., Ehrhardt V. 2008. Reference Ranges for Adults and Children Pre-Analytical Considerations. ROCHE Diagnostic.
3. Phadia AB. ImmunoCAP® Phadiatop®. Inserto del fabricante.